

## ViscoStat™, Astringedent™, Astringedent™ X & ViscoStat Plus™ koagulerende blodstillsningsmeddel

NO

**Beskrivelser**  
ViscoStat™ är en koagulerande blodstillsningslösning med ett ekvivalent bindmeddel i et viskot konsistens. Det är skärskämt med hårda och blöt veva, och har en pH på omkring 10.1.

**Astringedent** blodstillsningsmeddel är en 15,5 % jernfatskvälvant lösning i et viskot bindmeddel med en pH på omkring 1,0.

**Astringedent X** blodstillsningsmeddel är en 12,7 % jernfatskvälvant lösning med jern sulfat och en pH på omkring 1,0.

**ViscoStat Plus™** är en 22 % jernfatskvälvant lösning som är släskom med alla typer och lever till väskes veck.

**Indikationer för bruk**

Brukes til å stoppe forskjellige grader av blodløpninger i munhulen eller sulcusvascular under tannlegebedring og kirurgiske innlegg i munhulen, inkludert festa av tannproteser, gjennoppbygging operasjoner og periodontal behandling. Astringedent eller ViscoStat kan også brukes for retrofillinger, tannimplantater, gingivoplastikk og sett inn. Dersom det forekommer mørke røde blodløpninger er det mulig å stoppe dem ved hjelpe av Indi-Spense-sprøyten. Dette problemet kan unngås ved bruk av et midlertidig, vanligast forseglingssement, slik som vanlig Ultra-Blend.

**Varemerke: Vitale pulpotem (KUN Astringedent eller ViscoStat)**

1. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

2. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

3. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus, og pass på at begge har minst mulig rester.

4. Pålter et trykk lag med ZOE, etterhvert med et trykk lag med Ultra-Blend Plus, og pass på at begge har minst mulig rester til den lenverlet binding.

5. Prospørerstøpt utsporing av sprøytspruten. To fatig trim 1-3 til Indi-Spense-sprøyten.

6. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

7. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

8. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

9. Børst med en svak vannstråle.

10. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

11. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

12. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

13. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

14. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

15. Fjern Indi-Spense-sprøyten.

16. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

17. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

18. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

19. Børst med en svak vannstråle.

20. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

21. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

22. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

23. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

24. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

25. Fjern Indi-Spense-sprøyten.

26. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

27. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

28. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

29. Børst med en svak vannstråle.

30. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

31. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

32. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

33. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

34. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

35. Fjern Indi-Spense-sprøyten.

36. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

37. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

38. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

39. Børst med en svak vannstråle.

40. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

41. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

42. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

43. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

44. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

45. Fjern Indi-Spense-sprøyten.

46. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

47. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

48. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

49. Børst med en svak vannstråle.

50. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

51. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

52. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

53. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

54. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

55. Fjern Indi-Spense-sprøyten.

56. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

57. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

58. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

59. Børst med en svak vannstråle.

60. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

61. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

62. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

63. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

64. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

65. Fjern Indi-Spense-sprøyten.

66. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

67. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

68. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

69. Børst med en svak vannstråle.

70. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

71. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

72. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

73. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

74. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

75. Fjern Indi-Spense-sprøyten.

76. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

77. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

78. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

79. Børst med en svak vannstråle.

80. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

81. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

82. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

83. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

84. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

85. Fjern Indi-Spense-sprøyten.

86. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

87. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

88. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

89. Børst med en svak vannstråle.

90. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

91. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

92. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

93. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

94. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

95. Fjern Indi-Spense-sprøyten.

96. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

97. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

98. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

99. Børst med en svak vannstråle.

100. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

101. Fatig trim 1-3 til Avtrykk-avslutning for å klargjøre sprøyten.

102. Skrub grundig som overflaten der blodet. Etterhvert som overfladig, markt koagel vises, bør en assistente rette en svak vannstråle over området og så supp opp.

103. Fjern alt blodstillsningsmeddel med et trykk laget med Ultra-Blend Plus med 30 ml<sup>1,2</sup>.

104. Etterhvert som for bruk til å stoppe blodløpningen.

105. Fjern Indi-Spense-sprøyten.


106. Trykk Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml smørstøpseltempelet føres inn til ønsket oppfylling.

107. Skrub sprøyte fra høyre og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyten.

108. Etterhvert som overflade er klar, kan det føres til et annet område.

## ViscoStat™, Astringedent™, Astringedent™ X & ViscoStat Plus™ 응고성 지혈제

KO



설명 ViscoStat은 점성을 가진 수성 케리어를 불용성 결합제로 만든다. 화중 수술물의 시멘트와 직업으로 치유합니다. 약 1.0의 수소이온도자수( pH)로서 경적 및 연조직에도 안전합니다.

Astringedent 지혈제는 pH가 약 1.0인 수성 분체에 든 15.5% 황산제 2차 등기입니다. Astringedent X 지혈제는 pH가 약 1.0인 아황산과 황산 2차를 혼용한 12.7% 질산을 수용합니다. ViscoStat Plus는 모든 종류의 티슈에 적합하여 쉽게 셋팅되는 22% 염화제 2차 용액입니다.

응용 고침, 복구, 수술, 치수 치료 및 치과 및 구강 수술을 하는 동안 다양한 정도의 구강 모세혈관 끝이나 치주연(sulcular)을 자극하는 대 사용. Astringedent 또는 ViscoStat는 암전 전(retrofilling), 예복( tooth impaction), 임플란트제거(gingivectomy) 등에 사용됩니다. Astringedent 지혈제는 pH가 약 1.0인 아황산과 황산 2차를 혼용한 12.7% 질산을 수용합니다. ViscoStat Plus는 모든 종류의 티슈에 적합하여 쉽게 셋팅되는 22% 염화제 2차 용액입니다.

폐기 형식 ViscoStat, Astringedent, Astringedent X, ViscoStat Plus는 1.2 ml 주사기와 30 ml IndSpense 주사기(1.2, 3.5)으로 나옵니다.

IndSpense 주사기는 2 ml 주사기를 충전합니다.

a. 1-2 ml IndSpense 주사기와 함께 유도하십시오.

c. 1.2 ml 주사기와 함께 유도하십시오.

d. 주사기와 함께 유도하십시오.

e. 직업(Dento-Infusor)을 단단히 부착합니다.

f. 구강 내에 적용을 시작하기 전에 흐름을 확인하십시오.

사용 지침 인상(Impression) 1. 1-2 ml 주사기에서 후드(Luer) 캡을 제거하고 나서 직업(Dento-Infusor)을 부착합니다.

2. 치수 치료를 시작하기 전에 후드를 제거합니다.

3. 상처가 있는 조직을 디지털 카메라로 사진을 찍습니다. 그림 1.

4. 해당 부위의 범위를 확정하는 후 옹색제에서 상처 조직을 표시합니다. 그림 2.

5. 상당수 치과 전문가는 치과 치료가 필요할 때마다 부위 위로 물을 살짝 흘린 후 빨아들입니다.

6. 지혈제가 이루어지면, 공기/물 스파츌러를 이용하여 치과 치료가 깨끗이되고 저지 상태로 확인합니다(그림 3). 출혈 부위에서 위의 3-5단계를 완료하고 있습니다.

주의: 원칙적으로 최종 인상제는 전에 조직에 조제를 합니다.

7. 그들이 적절한 Ultrapak이나 다른 고체 코팅제에 넣어서 디스펜서에 넣거나 고체 허브에 넣습니다.

8. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

9. 그들이 적절한 Ultrapak이나 다른 고체 코팅제에 넣어서 디스펜서에 넣거나 고체 허브에 넣습니다.

10. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

11. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

12. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

13. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

14. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

15. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

16. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

17. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

18. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

19. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

20. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

21. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

22. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

23. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

24. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

25. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

26. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

27. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

28. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

29. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

30. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

31. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

32. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

33. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

34. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

35. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

36. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

37. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

38. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

39. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

40. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

41. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

42. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

43. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

44. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

45. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

46. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

47. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

48. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

49. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

50. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

51. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

52. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

53. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

54. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

55. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

56. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

57. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

58. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

59. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

60. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

61. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

62. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

63. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

64. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

65. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

66. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

67. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

68. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

69. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

70. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

71. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

72. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

73. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

74. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

75. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

76. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

77. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

78. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

79. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

80. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

81. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

82. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

83. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

84. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

85. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

86. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

87. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

88. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

89. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

90. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

91. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

92. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

93. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

94. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

95. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

96. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

97. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

98. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

99. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

100. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

101. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기와 펌프를 사용하십시오.

102. 그들이 경과 피하기 위해, 위치는 앞에 대해하는 수술 주사기